

DER WELLENBRECHER



SUCCESSOR

TOP Pack

- ERFASST AUCH IN WELLEN AUFLAUFENDE HIRSE-ARTEN UND UNKRÄUTER
- MIT SEHR BREITEM WIRKUNGS-SPEKTRUM



Stähler



Mais



Getreide



Kartoffeln



Raps



Rüben



Haus & Hof



Sonderkulturen

STÄHLER MACHT DIE ERNTE STARK

www.staehler.com

SUCCESSOR® TOP PACK

DER WELLENBRECHER IN IHREM MAIS

- Erfasst auch in Wellen auflaufende Hirsearten und Unkräuter
- Flexibel einsetzbar je nach Hirseart

SUCCESSOR® TOP PACK: KOMBIPACK AUS SUCCESSOR T UND MIKADO

STECKBRIEF SUCCESSOR® T

- Vorwiegend **bodenaktives** (Verhältnis ca. 80:20) Nachauflauf-Herbizid mit dem Wirkstoff **Pethoxamid** zur sicheren Bekämpfung von Hirsearten und zweikeimblättrigen Unkräutern in Mais
- Wirkstoffe:
300 g/l Pethoxamid
187,5 g/l Terbutylazin
- Suspoemulsionskonzentrat (SE)

STECKBRIEF MIKADO®


- Überwiegend **blattaktives** (Verhältnis ca. 65:35) Nachauflauf-Herbizid mit einer zusätzlichen Wirkungskomponente zur Aufnahme über die Wurzel für sichere Wirkung
- Wirkstoff: 300 g/l Sulcotrione
- Suspensionskonzentrat (SC)



SUCCESSOR
TOP Pack



GENIAL ABGESTIMMT ZUR SICHEREN BEKÄMPFUNG VON HIRSEARTEN UND ALLEN WICHTIGEN UNKRÄUTERN



SUCCESSOR® TOP PACK:
DER WELLENBRECHER

WORAUF MÜSSEN SIE BEIM EINSATZ VON SUCCESSOR TOP PACK ACHTEN?

Wichtig ist, vorher ein genaues Bild über die auf Ihren Flächen vorkommende Hirseart zu erhalten, da sich sowohl der Einsatzzeitpunkt als auch die Aufwandmenge nach der jeweiligen Hirseart richtet. Daher finden Sie nachfolgend die


wesentlichen Unterscheidungsmerkmale von Hühnerhirse, Borstenhirse und Fingerhirse.

Auf Ihrem Schlag kommen keine Hirsen vor? Dann finden Sie Ihre Empfehlung im Einsatzdiagramm ganz unten.




	HÜHNERHIRSE (ECHINOCHLOA CRUS-GALLI)	BORSTENHIRSEARTEN (SETARIA SSP.)	FINGERHIRSEARTEN (DIGITARIA SSP.)
RISPE			
BLATTANSATZ			
Blatthäutchen:	fehlt	fehlt, dafür Kranz mit kurzen, feinen Haaren vorhanden	vorhanden (ca. 2 mm)

EMPFEHLUNGEN FÜR SAUBEREN MAIS – AUF DIE HIRSE KOMMT ES AN!



SUCCESSOR TOP PACK IM HARTEN PRAXISTEST – Zusammenfassung von 25 amtlichen Versuchsergebnissen



Bei so einem Unkrautdruck hat Ihr Mais keine Chance!



Nachtschatten



W. Gänsefuß



Klettenlabkraut



Erdrauch

Tipp
Wichtig zu wissen: Bei trocken-warmer Witterung, niedriger Luftfeuchtigkeit und hohem Kamilledruck bzw. großen Unkrautstadien empfiehlt sich die Zugabe von 0,3-0,5 l/ha Buctril®

PROBLEMKRÄUTER? KEIN PROBLEM FÜR SUCCESSOR TOP PACK!

Successor TOP Pack bekämpft auch eine Reihe von Problemkräutern*:

■ **Kartoffeldurchwuchs:** Optimale Behandlung bei einer Höhe von (10–) 15 cm Wuchshöhe der Kartoffeln. Da sich der Einsatzzeitpunkt von Successor TOP Pack nach den Hirsearten richten sollte und die Durchwuchskartoffeln zu diesem Zeitpunkt nicht die optimale Wuchshöhe erreicht haben, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit 0,5–1,0 l/ha Mikado.

■ **Storchschnabelarten:** Bei ausreichender Bodenfeuchte werden beim Einsatz von Successor TOP Pack (4 l/ha Successor T + 1,0 l/ha Mikado) Storchschnabel-Arten miterfasst.

■ **Erdmandelgras:** Durch die Tankmischung Successor TOP Pack (3,0–4,0 l/ha Successor T + 1,0 l/ha Mikado) und 0,3 l/ha Bucril wird eine gute Reduktion des Erdmandelgrases erreicht. In Versuchen der LWK Niedersachsen zeigte diese Tankmischung mit die besten Wirkungserfolge:



BEKÄMPFUNG VON ERDMANDELGRAS

VERSUCHSGLIED AUFWANDMENGE/ha	TERMIN AM		PFLANZEN/m ²	RESTPFLANZE ERDMANDELGRAS ANZAHL X RESTANTEIL
	BEHANDLUNG	BONITUR		
Unbehandelt	–	26.05.	230	531
		30.06.		
Successor T 3,0 l Mikado 1,0 l Bucril 0,3 l	26.05.	26.05.	220	→ 75 ←
		30.06.		
Vergleichsmittel 1	26.05.	26.05.	270	80
		30.06.		
Vergleichsmittel 2	26.05.	26.05.	280	244
		30.06.		

Zusammenfassung von 24 Ergebnissen/Prüfstellen

■ **Stechapfel:** Beim Einsatz von Successor TOP Pack (3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado) wird Stechapfel sehr gut bekämpft.

■ **Huflattich, Kompasslattich, Ampferblättriger Knöterich, Erdrauch:** werden durch Successor TOP Pack miterfasst.

■ **Ackerschachtelhalm, Disteln, Landwasserknöterich:** unterdrückende Wirkung gegen bereits aufgelaufene Pflanzen (Abbrenneffekt).

■ **Ackerminze, Ambrosie, Hundspetersilie, Samtpappel (Lindenblättrige Schönmalve), Ausfallraps und Ausfallphacelia** werden durch Successor TOP Pack mit guten Ergebnissen bekämpft.

■ **Sonnenblumen:** gute Teilwirkung, evtl. Nachbehandlung mit 1,0–1,5 l/ha Mikado erforderlich.

■ **Leguminosen (Durchwuchs):** junge Pflanzen werden miterfasst.

* teilweise eigene Erfahrungen



VERGLEICH DER WIRKSTOFFMENGE JE ha

	AUFWANDMENGE l/ha	AUFWANDMENGE l/ha addiert	Chloracetamide	WIRKSTOFF (g/ha)	
				Triazine	Triketone
Successor TOP Pack	4,0 + 1,0	5	1200	→ 750 ←	300
VGM 1/VGM 2	1,25 + 1,5	2,75	1200	495	105
Prozentverhältnisse			100 %	66 %	35 %

Successor TOP Pack mit reichlicher Wirkstoffausstattung an Terbutylazin für eine sichere Langzeitwirkung auch gegen Unkräuter wie Knöterich

DAS **EXTRA** FÜR SIE – SUCCESSOR® TOP PACK

- Optimale **Kombination aus blatt- und bodenaktiven Wirkstoffen**
- Ideale Sololösung **für den frühen Einsatz**
- Pethoxamid mit **hervorragender Dauerwirkung (bis zu 11 Wochen nach der Anwendung)** einschließlich Hühner- und Fingerhirse und zur Erfassung bereits Triazin-resistenter Unkrautarten
- Sehr gute **Pflanzenverträglichkeit auch bei Tankmischungen mit Ergänzungsprodukten**
- **Breit wirksame** und wirtschaftliche Wirkstoffkombination zur Minimierung der Überfahrten
- Gute Basiswirkung **gegen Kartoffeldurchwuchs**
- **Einsatz flexibel** im frühen Nachauflauf bis max. 4-Blattstadium des Maises
- Auch bei trockenen Witterungsbedingungen ist Successor TOP Pack bei nachfolgendem Regen in der Leistung voll da

Successor TOP Pack liefern wir als:

25 l-Gebinde (2 x 10 l Successor T + 5 l Mikado) _____ Art.-Nr. 5526
ausreichend für 5 ha und mehr!

Diese Druckschrift dient der Information.
Sie ersetzt nicht das Lesen der ausführlichen Gebrauchsanleitung.

© Die Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller

